



Évaluation des incidences Natura 2000

Thématique ICPE « Élevage »

PREAMBULE

Cette trame a vocation à guider **l'évaluation simplifiée** des incidences Natura 2000 des projets qui requièrent une étude d'incidence Natura 2000 au titre de la liste nationale qui figure à l'article R.414-19 du code de l'environnement et de la 1^{ère} liste locale arrêtée par le préfet de département, sur le territoire départementale du Pas-de-Calais le 18/02/2011 et sur le territoire départemental du Nord le 25/02/2011.

Conformément au **R.414-23** de ce même code, le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, par la personne publique responsable, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, porteur du projet.

Cette évaluation est **proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation** des habitats et des espèces présents sur le site.

Le choix d'une étude simplifiée ou approfondie dépend des incidences potentielles des projets sur le(s) site(s) Natura 2000.

Si au cours de l'évaluation préliminaire le porteur de projet découvre que son projet est **susceptible d'avoir des incidences notable sur le(s) site(s) Natura 2000**, il devra dans ce cas, se diriger vers une **évaluation plus approfondie** de son dossier.

Dans tous les cas, le dossier doit contenir les pièces listées au R.414-23 du code de l'environnement et être **conclusif sur l'absence ou la présence d'incidence sur les habitats et espèces d'intérêt communautaires du(des) site(s)**.

Sommaire

1. Description de l'activité
2. Identification des sites Natura 2000 concernés
 - 2.1 Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet
 - 2.2 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 200
 - 2.3 Conclusion partielle
3. Description du site Natura 2000 concerné
4. Analyse des habitats et des espèces susceptibles d'être impactés par le projet
5. Analyse des incidences du projet
6. Conclusion

1. Description de l'activité

- Voir le dossier de déclaration
- Voir le dossier d'autorisation
- Autre

2. Identification des sites Natura 2000 concernés

2.1 Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet

Tableau 1 : Sites Natura 2000 recensés à proximité de la zone de projet

N° de la zone	Nom de la zone	Type de zone	Localisation par rapport au site d'exploitation	Localisation par rapport aux îlots les plus proches
FR3100491	Landes, mares et bois acides du plateau de Sorrus/St Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil (62)	Site SIC/ZSC dit « Habitat »	9,2 km au Sud-Ouest	4,8 km à l'Ouest de l'îlot T2
FR3100492	Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Site SIC/ZSC dit « Habitat »	15,7 km au Sud	5,1 km au Sud de l'îlot T4
FR2212003	Marais arrière littoraux picards	Site SIC/ZSC dit « Habitat »	17 km au Sud	5,8 km au Sud de l'îlot T4
FR3110083	Marais de Balançon	Site ZPS dit « Oiseaux »	17,5 km au Sud-Ouest	10,4 km à l'Est de l'îlot T2

2.2 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

Le tableau ci-dessous présente les impacts potentiels des activités avicoles de la SARL Mavime sur les sites Natura 2000 recensés.

Tableau 2 : Interactions entre la zone Natura 2000 et l'activité avicole de la SARL Mavime

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE			
Landes, mares et bois acides du plateau de Sorrus/St Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil (62)	Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Landes humides septentrionales à Erica tetralix (4010)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Landes sèches européennes (4030)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (6230)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur

¹ Cf. DOCOB : seuls les impacts négatifs ont été retenus ici. Certains impacts potentiellement positifs ont été relevés pour l'activité agricole

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Landes, mares et bois acides du plateau de Sorrus/St Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil (62)	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Dépansions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (91E0)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à liex et parfois à <i>Taxus</i> (9120)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du <i>Carpinus betuli</i> (9160)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i> (9190)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou des <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> (3130)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp (3140)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion (3260)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Tourbières de transition et tremblantes (7140)	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Tourbières basses alcalines (7230)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (91E0)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
Marais arrière littoraux picards	Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou des <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> (3130)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à <i>Chara</i> spp (3140)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l' <i>Hydrocharition</i> (3150)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Marais arrière littoraux picards	Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion (3260)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (6230)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (6410)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaux et des étages montagnard à alpin (6430)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Tourbières de transition et tremblantes (7140)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (7210)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Lessivage de l'azote excédentaire en cas de sur-fertilisation vers les ressources en eau lors d'épisodes pluvieux. → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; parcelles à proximité du réseau hydrographique susceptible d'avoir un impact par ce biais en prairies et très peu fertilisées ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Tourbières basses alcalines (7230)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Marais arrière littoraux picards	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (91E0)	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Uniformisation des milieux par surfertilisation → Risque faible car épandages en dehors des sites Natura 2000 ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
ESPÈCES			
Landes, mares et bois acides du plateau de Sorrus/St Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil (62)	Triton crêté <i>Triturus cristatus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les reptiles
	Grand rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Grand murin <i>Myotis myotis</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Vertigo des moulins <i>Vertigo moulinsiana</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu favorable pour les gastéropodes

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité l'habitat inféodé à l'espèce par lessivage de surplus d'azote et/ou de départ de terres dans les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux → Risque faible car parcellaire d'épandage toujours couvert ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Lampetra fluviatilis <i>Lampetra fluviatilis</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité l'habitat inféodé à l'espèce par lessivage de surplus d'azote et/ou de départ de terres dans les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux → Risque faible car parcellaire d'épandage toujours couvert ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Saumon atlantique <i>Salmo salar</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité l'habitat inféodé à l'espèce par lessivage de surplus d'azote et/ou de départ de terres dans les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux → Risque faible car parcellaire d'épandage toujours couvert ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Chabot commun <i>Cottus gobio</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité l'habitat inféodé à l'espèce par lessivage de surplus d'azote et/ou de départ de terres dans les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux → Risque faible car parcellaire d'épandage toujours couvert ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Petit rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Grand rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Epanchage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Grand murin <i>Myotis myotis</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Ache rampante <i>Helosciadium repens</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de l'habitat inféodé à l'espèce pouvant entraîner sa destruction → Risque faible car peu de probabilité de retrouver une espèce végétale remarquable sur des terres agricoles
	Planorbe naine <i>Anisus vorticulus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu favorable pour les gastéropodes
Marais arrière littoraux picards	Vertigo étroit <i>Vertigo angustior</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu favorable pour les gastéropodes
	Vertigo des moulins <i>Vertigo moulinsiana</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu favorable pour les gastéropodes
	Chabot commun <i>Cottus gobio</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité l'habitat inféodé à l'espèce par lessivage de surplus d'azote et/ou de départ de terres dans les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux → Risque faible car parcellaire d'épandage toujours couvert ; fertilisation raisonnée et conforme aux exigences de la Directive Nitrates en vigueur
	Triton crêté <i>Triturus cristatus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de l'habitat inféodé à l'espèce par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les reptiles

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie	Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les mammifères
	Ache rampante <i>Helosciadium repens</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de l'habitat inféodé à l'espèce pouvant entraîner sa destruction → Risque faible car peu de probabilité de retrouver une espèce végétale remarquable sur des terres agricoles
	Ecaille chinée <i>Euplagia quadripunctaria</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les insectes
Marais de Balançon	Butor étoilé <i>Botaurus stellaris</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Héron bihoreau <i>Nycticorax nycticorax</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Spatule blanche <i>Platalea leucorodia</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Marais de Balançon	Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Milan royal <i>Milvus milvus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Busard cendré <i>Circus pygarrus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Balbusard pêcheur <i>Pandon haliaetus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Marais de Balançon	Grue cendrée <i>Grus grus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Echasse blanche <i>Himantopus himantopus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Avocette élégante <i>Recuvirostra avosetta</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Chevalier combattant <i>Philomachus pugnax</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Bécassine double <i>Gallinago media</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Barge à queue noire <i>Limosa limosa</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux
	Barge rousse <i>Limosa lapponica</i>	Epandage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épandage peu attractif pour les oiseaux

Nom de la zone	Habitats et/ou espèces susceptibles d'être impactés	Activité agricole ¹ ayant potentiellement un impact négatif sur l'habitat ou l'espèce	Impacts potentiels de l'activité de la SARL Mavime
Marais de Balançon	Glaréole à collier <i>Tringla glareola</i>	Epannage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épannage peu attractif pour les oiseaux
	Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>	Epannage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épannage peu attractif pour les oiseaux
	Martin-pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis</i>	Epannage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épannage peu attractif pour les oiseaux
	Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i>	Fertilisation Epannage des fumiers de volailles produits par la SARL par les tiers	Dégradation de la qualité des zones de repos ou de chasse par uniformisation des milieux suite à une surfertilisation → Risque faible car parcellaire d'épannage peu attractif pour les oiseaux

2.3 Conclusion partielle

Le parcellaire d'épandage est un milieu agricole régulièrement fertilisé globalement peu favorable au développement d'habitats et d'espèces remarquables. Les pratiques de fertilisation des tiers de la SARL Mavime sont encadrées par un plan d'épandage qui respecte les prescriptions de la Directive Nitrates en vigueur pour la protection de la ressource en eau.

Les sites Natura 2000 sont relativement éloignés du site d'exploitation et du parcellaire d'épandage. Un risque de transfert existe via la Canche : deux parcelles (îlots M24 et M37) sont localisées à proximité du cours d'eau et de ses affluents à moins de 10 km des sites Natura 2000. Ces îlots sont cependant exploités en tant que prairies temporaires et ne sont pas ou peu fertilisés par les fumiers de la SARL Mavime. Le risque d'incidence est donc très faible.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît plausible que l'activité avicole de la SARL Mavime n'ait pas d'incidence sur les sites Natura 2000 à proximité de la zone de projet.

3. Description du site Natura 2000 concerné

Non concerné

4. Analyse des habitats et des espèces susceptibles d'être impactés par le projet

Non concerné

5. Analyse des incidences du projet

Non concerné


6. Conclusion

Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence significative au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés ?

NON, pas d'incidence ou incidence négligeable

OUI, effets potentiels significatifs

Le 19 juillet 2017



- Légende**
- Limites communales
 - Cours d'eau
 - Bâtiments**
 - Siège d'exploitation
 - Bâtiments V1 et V2

- Parcellaire d'épandage**
- Ilots mis à disposition par l'EARL Trunnet
 - Ilots mis à disposition par l'EARL Martel

- Périmètres Natura 2000**
- Sites Natura 2000 à proximité

