

ANNEXE 14 :

**Etude d'aptitude agronomique des parcelles à
l'épandage par APTISOLE**



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage :

JB VIANDE

Produit d'épandage : Fumier Abattoir

Unité de production :

JB VIANDE

Rapport C/N : Entre 8 et 25 - Tenue en tas : Solide

| Parcelle | Sondage | Surface épandable (ha) | Texture de l'horizon labouré | Sensibilité à la battance | Pente | Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale) | Durée de l'engorgement | Apt. à l'épand. (Sandre)* |
|----------|---|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|--|------------------------|---------------------------|
| COU.10 | COU.10 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 2,08 | limon | Très battant (IB : 5,63) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.11 | COU.11 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 3,02 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,58 | Absence | 2 |
| COU.12 | COU.12 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 0,50 | limon argileux | Très battant (IB : 3,15) | Absence | 0,79 | Absence | 2 |
| COU.13 | COU.13 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 1,21 | limon argileux | Peu battant (IB : 1,38) | Absence | 0,78 | Absence | 2 |
| COU.14 | COU.6/COU.14 Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture | 1,41 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,47 | Absence | 2 |
| COU.16 | COU.10 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 0,35 | limon | Très battant (IB : 5,63) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.17 | COU.17 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 0,75 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.18 | COU.18 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 0,23 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,73 | Absence | 2 |
| COU.19 | COU.19 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 2,77 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.20 | COU.20 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 1,15 | limon argileux | Peu battant (IB : 1,41) | Absence | 0,78 | Absence | 2 |
| COU.20 | COU.20Route Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture | 1,27 | limon argileux | Peu battant (IB : 1,38) | Absence | 0,43 | Absence | 2 |
| COU.21 | COU.21 Epandage suivi ou sur couvert végétal | 2,92 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |

| Parcelle | Sondage | Surface épanachable (ha) | Texture de l'horizon labouré | Sensibilité à la battance | Pente | Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale) | Durée de l'engorgement | Apt. à l'épand. (Sandre)* |
|----------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|--|------------------------|---------------------------|
| COU.25 | COU.26/25 Epannage suivi ou sur couvert végétal | 1,13 | limon argileux | Peu battant (IB : 1,25) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.26 | COU.26/25 Epannage suivi ou sur couvert végétal | 7,38 | limon argileux | Peu battant (IB : 1,25) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.3 | COU.3 Pour un épannage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épannage de printemps. Epanner au plus proche des besoins de la culture | 1,05 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,33 | Absence | 2 |
| COU.4 | COU.4 Epannage suivi ou sur couvert végétal | 2,15 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,77 | Absence | 2 |
| COU.6 | COU.6/COU.14 Pour un épannage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épannage de printemps. Epanner au plus proche des besoins de la culture | 1,45 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,47 | Absence | 2 |
| COU.7 | COU.7 Pour un épannage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épannage de printemps. Epanner au plus proche des besoins de la culture | 2,87 | argile limoneuse | Peu battant (IB : 0,89) | Absence | 0,44 | Absence | 2 |
| COU.9 | COU.9 Pour un épannage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épannage de printemps. Epanner au plus proche des besoins de la culture | 2,36 | limon | Assez (IB : 1,91) | Absence | 0,49 | Absence | 2 |

* 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit